

畑に^{から}殻を、残しません。

微生物分解性硫黄被覆肥料入り

匠ブレンド[®] ネギ専用10号


10-14-7 苦土1

最初に入れば
後が楽!



匠ブレンドの
溝施肥・側条施肥により
施肥作業の省力化と
減肥が可能です!

20kgポリ袋入り



サンアグロ

匠ブレンド®

ネギ専用10号

チッ素		リン酸	カリ	苦土
10%	速効性：2.2 緩効性：7.8	14%	7%	1%

※緩効性チッ素＝硫黄被覆肥料を使用

使い方

○溝施肥の例

例① 2回施肥（200kg/10aの場合）

定植時：40～80kgを植え溝に施肥し定植します。
埋戻し時：120～160kgを溝施肥します。

例② 3回施肥（200kg/10aの場合）

定植時：40～80kgを植え溝に施肥し定植します。
埋戻し時：40～80kgを溝施肥します。
土寄せ時：40～80kgを施肥します。

- ☆「溝施肥」の場合、根が直接肥料に触れると、濃度障害を起こしますので、施肥後軽く覆土を行って下さい。
- ☆「溝施肥」を行う場合は最寄りの販売店等にご相談下さい。
- ☆圃場の条件や作付時期によって、施肥量は適宜調整して下さい。
- ☆気象条件などにより、肥え切れが発生した場合は生育状況に応じて適宜追肥を行ってください。
- ☆全層施肥にも使用できます。

使用上の注意

- この被覆肥料は、硫黄で被覆された肥料です。硫黄の被膜は最終的には自然界で分解されますが、分解される過程では被膜殻が残存し、水田では浮上することがありますので、被膜殻を圃場外へ流出させないように注意して下さい。
- この肥料は、強い衝撃や摩擦によって被覆肥料の被膜の一部が損傷し、溶出が早まる恐れがありますので、注意して下さい。
- 被覆肥料の溶出期間は土壌の温度によって変わります。低い温度では、溶出期間は長くなります。
- 機械施肥の場合には、被膜を破損しない機械で散布して下さい。施肥機の取扱説明書をよく読んでご使用下さい。
- 施肥後の蒸気消毒は避けて下さい。
- 石灰等のアルカリ資材と接触するとアンモニアガスが発生することがありますので注意して下さい。
- 食べられません。幼児等の手の届かない所に保管して下さい。
- 取扱いは保護メガネ、保護手袋、保護マスクを使用して下さい。
- 皮膚に付着したり、目に入ったり、吸い込んだ場合には、水でよく洗浄またはうがいを行って下さい。
- 炎症等がみられる場合や気分がすぐれない場合は医師の診断を受けて下さい。
- 保管は直射日光を避け、乾燥した涼しい所を選んで下さい。
- 荷崩れが起こらないように、保管して下さい。
- 金属を腐食することがあります。付着した場合は洗浄して下さい。
- 肥料の袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないで下さい。窒息するおそれがあります。
- 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえたり、また他のものを入れないで下さい。
- 開封後は、なるべく短期間に使い切ってください。またやむを得ず開封後保管する場合は、袋の口を固く閉じ、密封して下さい。

指定配合肥料 生産業者保証票

肥料の名称 硫黄被覆尿素入り047

保証成分量(%)

窒素全量	10.0
内アンモニア性窒素	1.5
く溶性りん酸	14.0
内水溶性りん酸	7.6
水溶性加里	7.0
く溶性苦土	1.0

原料の種類(配合原料)

過りん酸石灰、化成肥料、被覆窒素肥料
備考:重量割合の大きい順である。

正味重量 20キログラム

生産した年月 上部シール部に記載

生産業者の氏名又は名称及び住所

サンアグロ株式会社
東京都中央区日本橋本町一丁目10番5号

生産した事業場の名称及び所在地

上部シール部に略称で記載

製造

 **サンアグロ**

取扱