

水稻用後期除草剤

メタミホップ配合



高葉齢のノビエに!

トドメMF[®]

1キロ粒剤・乳剤

特長

- ① 高葉齢のノビエに高い効果を示します。
(1キロ粒剤：ノビエ5葉期、乳剤：ノビエ7葉期)。
- ② 2週間程度の土壌処理効果(残効性)を示します。
- ③ 除草効果の発現が早く、枯れ上がりに優れます。
- ④ 水稻に対し高い安全性があります。
- ⑤ 乳剤は展着剤不要で、また耐雨性にも優れます。

【トドメMF1キロ粒剤】 農林水産省登録 第23958号
成分 メタミホップ.....1.35%

【トドメMF乳剤】 農林水産省登録 第23959号
成分 メタミホップ.....4.9%

人畜毒性：普通物(1キロ粒剤・乳剤)※

※「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

◆ トドメMF乳剤

適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	メタミホップを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
移植水稻 直播水稻	ノビエ	移植後14日～ル ¹ 17葉期まで 但し、収穫50日前まで	200mL /10a	100L /10a	2回以内	湛水散布又は落水散布	3回以内(乳剤は2回以内)
		は種後10日～ル ¹ 15葉期まで 但し、収穫50日前まで				雑草茎葉散布	